

Covid-19

Κατηγοριοποίηση Εισαγωγής Παιδιών Στο Νοσοκομείο

Εισαγωγή ασθενούς → Ταξινόμησή του σε κατηγορία

Υψηλού κινδύνου COVID-19 Κόκκινη Κατηγορία

- α) Επιβεβαιωμένο SARS-CoV-2 (COVID-19) θετικό τεστ
ή
β) Συμπτωματικός ή ύποπτος για COVID 19 ασθενής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ιστορικό επαφής με ασθενή με συμπτώματα COVID-19, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί κλινικά και αναμένουν τα αποτελέσματα των τεστ
ή
γ) Συμπτωματικά άτομα που αρνούνται τον έλεγχο ή ο έλεγχος δεν είναι δυνατός.

**Απομόνωση με προφυλάξεις σταγονιδίων
Καθαριότητα επιπέδου 2**

Μέτριου Κινδύνου COVID-19 Πορτοκαλί Κατηγορία

- α) Ασυμπτωματικός ασθενής ενώ αναμένεται το αποτέλεσμα της δοκιμής SARS-CoV-2 (COVID-19) χωρίς γνωστή πρόσφατη έκθεση σε COVID-19
ή
β) Έχει αναπνευστικά συμπτώματα ιού αλλά αρνητικό ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
ή
γ) Έχει επιβεβαιωμένη ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού (π.χ. Influenza, RSV, κ.λ.π.)
ή
δ) Ασθενείς σε καραντίνα μετά από ταξίδι σε μη ασφαλή χώρα
ή
ε) Μετά την έκθεση στον ιό COVID 19 με αρνητικό τεστ
ή
στ) Ασυμπτωματικά άτομα που αρνούνται τον έλεγχο ή δεν είναι δυνατός ο έλεγχος.

Απομόνωση με προφυλάξεις σταγονιδίων

Χαμηλού κινδύνου COVID-19 Πράσινη Κατηγορία

- α) Ασυμπτωματικός και καμία γνωστή έκθεση ή μόλυνση με COVID-19 και αρνητικό τεστ SARS-CoV-2 (COVID-19) εντός 72 ωρών από την εισαγωγή
ή
β) Ασυμπτωματικός και καμία γνωστή πρόσφατη μόλυνση με COVID-19 και αρνητικό τεστ SARS-CoV-2 (COVID-19) εντός 72 ωρών από την προγραμματισμένη διαδικασία που περιλαμβάνει έκθεση σε αερολύματα
ή
γ) Άτομα που έχουν αναρρώσει από το COVID-19 και πληρούν τα κριτήρια ανάρρωσης
Ακολουθήστε τα σωστά κριτήρια ανάρρωσης είτε για φυσιολογική ανοσία είτε για ανοσοκατασταλμένους

Εφαρμόστε τις κλασικές προφυλάξεις

Οδηγίες ΜΑΠ:

- Χρήση FRSM και προστατευτικού εξοπλισμού για γενική φροντίδα ασθενών.
- Αλλαγή σε FFP μάσκα και προσωπίδα για κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει έκθεση σε αερολύματα.
- Χρήση ποδιάς για απόσταση <2 μέτρων από τον ασθενή.
- Χρήση γαντιών μίας χρήσης σε περίπτωση επαφής με αίμα ή βιολογικά υγρά.

- Χρήση FRSM για γενική φροντίδα ασθενών και προστατευτικού εξοπλισμού μετά από εκτίμηση κινδύνου.
- Αλλαγή σε FFP μάσκα και προσωπίδα για κάθε διαδικασία που περιλαμβάνει έκθεση σε αερολύματα.
- Χρήση ποδιάς για απόσταση <2 μέτρων από τον ασθενή.
- Χρήση γαντιών μίας χρήσης σε περίπτωση επαφής με αίμα ή βιολογικά υγρά.

- Χρήση FRSM για γενική φροντίδα ασθενών
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί FRSM για τις διαδικασίες έκθεσης σε αερολύματα.
- Χρήση προσωπίδας κατά την έκθεση σε αερολύματα. για AGPs.
- Χρήση γαντιών μίας χρήσης σε περίπτωση επαφής με αίμα ή βιολογικά υγρά.