



COVID 19

Κατηγοριοποίηση ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση

Εισαγωγή ασθενή → Κατάταξη σε κατηγορία → Χρήση ίδιας κατάταξης για το χειρουργείο

Υψηλού κινδύνου COVID-19 Κόκκινη Κατηγορία

- α) Επιβεβαιωμένο SARS-CoV-2 (COVID-19) τεστ θετικό
 - ή
 - β) Συμπτωματικός ή ασθενής με υποψία COVID-19, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ιστορικό επαφής με συμπτωματικό ασθενή, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί κλινικά και αναμένουν τα αποτελέσματα των τεστ
 - ή
 - γ) Συμπτωματικά άτομα που αρνούνται τον έλεγχο ή δεν είναι δυνατός ο έλεγχος.
- * Ανατρέξτε στη διαχείριση ασθενών με αναπνευστικά συμπτώματα εάν βρίσκεστε σε κόκκινη ή πορτοκαλί κατηγορία**
- Απομόνωση με προφυλάξεις σταγονιδίων**
Καθαριότητα επιπέδου 2

Μέτριου Κινδύνου COVID-19 Πορτοκαλί Κατηγορία

- α) Ασυμπτωματικός και αναμένεται το αποτέλεσμα της δοκιμής SARS-CoV-2 (COVID-19) χωρίς γνωστή πρόσφατη επαφή με COVID-19
 - ή
 - β) Έχει αναπνευστικά συμπτώματα ιού αλλά αρνητικό ρινοφαρυγγικό επίχρισμα
 - ή
 - γ) Έχει επιβεβαιωμένη ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού (π.χ. Influenza, RSV, κ.λ.π.)
 - ή
 - δ) Ασθενείς σε καραντίνα μετά από ταξίδι σε μη ασφαλή χώρα
 - ή
 - ε) Μετά την επαφή με ασθενή θετικό στον COVID 19 αλλά έχει αρνητικό αποτέλεσμα
 - ή
 - στ) Ασυμπτωματικά άτομα που αρνούνται τον έλεγχο ή δεν είναι δυνατός ο έλεγχος
- Απομόνωση με προφυλάξεις σταγονιδίων**
Καθαριότητα επιπέδου 2

Χαμηλού κινδύνου COVID-19 Πράσινη Κατηγορία

- α) Ασυμπτωματικός και καμία γνωστή πρόσφατη μόλυνση με COVID-19 και αρνητικό τεστ SARS-CoV-2 (COVID-19) εντός 72 ωρών από την εισαγωγή
 - ή
 - β) Ασυμπτωματικός και καμία γνωστή πρόσφατη μόλυνση με COVID-19 και αρνητικό τεστ SARS-CoV-2 (COVID-19) εντός 72 ωρών από την προγραμματισμένη διαδικασία που περιλαμβάνει έκθεση σε αερολύματα
 - ή
 - γ) Άτομα που έχουν αναρρώσει από το COVID-19 και πληρούν τα κριτήρια ανάρρωσης
- *Ακολουθήστε τα σωστά κριτήρια ανάρρωσης είτε για φυσιολογική ανοσία είτε για ανοσοκατασταλαμένους**
- Χρησιμοποιείτε τις κλασικές προφυλάξεις**

Οδηγίες Προφυλάξεων Μόνωσης

- Χρήση ειδικής/ διαμορφωμένης αίθουσας χειρουργείου COVID 19.
- Διασωλήνωση και ανάρρωση στην αίθουσα χειρουργείου.
- Χρήση μάσκας FFP και προσωπίδα προστασίας από όλο το προσωπικό που βρίσκεται στην αίθουσα.
- Χρήση ολόσωμης αδιάβροχης χειρουργικής ρόμπας.
- Διατήρηση της αίθουσα κενής για 20 λεπτά και μετά πραγματοποίηση υγιεινομικής καθαριότητας επιπέδου 2.

- Διαχείριση χειρουργείου ως μολυσματικό (τελευταίο στη λίστα).
- Διασωλήνωση στην αίθουσα αναισθησίας και ανάρρωση στη χειρουργική αίθουσα.
- Χρήση μάσκας FFP και προσωπίδας από το προσωπικό που εκτίθεται σε αερολύματα.
- Χρήση χειρουργικής μάσκας για γενική φροντίδα.
- Χρήση αδιάβροχης ποδιάς.
- Διατήρηση της αίθουσα κενής για 20 λεπτά και μετά πραγματοποίηση υγιεινομικής καθαριότητας επιπέδου 2.

- Διαχείριση χειρουργείου ως κλασικό.
- Διασωλήνωση στην αναισθησιολογική αίθουσα και αποσωλήνωση στην αίθουσα χειρουργείου.
- Ανάρρωση στην αίθουσα ανάνηψης.
- Χρήση χειρουργικής μάσκας για γενική φροντίδα και χρήση χειρουργικής μάσκας & προσωπίδας κατά την έκθεση σε αερολύματα.
- Χρήση ποδιάς σύμφωνα με τις κλασικές προφυλάξεις.
- Καθαρισμός εξοπλισμού μεταξύ των ασθενών (δεν απαιτείται αναμονή 20 λεπτών).
- Ο επόμενος ασθενής μπορεί να περιμένει στην αναισθησιολογική αίθουσα, όσο ο προηγούμενος αποσωληνώνεται στην αίθουσα χειρουργείου.

